

COVID-19 患者檢測資訊

2020 年 4 月

大多數 COVID-19 感染者會出現發燒、咳嗽和咽喉痛等症狀。有些會失去嗅覺和/或味覺，有些則會出現呼吸困難。感染者可以透過咳嗽或打噴嚏以及直接接觸將疾病傳播給他人。出門在外時，請務必帶上面罩以保護自己並防止疾病傳播。**COVID-19 鼻拭子測試可檢測出導致 COVID-19 感染的實際病毒。**

如果我的檢測結果呈陽性意味著什麼？

如果您的鼻拭子測試結果呈陽性，則表明您可能已感染了 COVID-19 病毒。

如果我的檢測結果呈陰性意味著什麼？

如果您的鼻拭子測試結果為陰性，則意味著您沒有感染 COVID-19 病毒，或者您感染了 COVID-19 病毒，但是該測試未能檢測到病毒。我們仍在研究 COVID-19 病毒和這項檢測。

如果我的檢測結果呈陽，我該怎麼做？

您應該至少在家裡呆七天，最後三天不發燒（在不服用對乙醯氨基酚或布洛芬等退燒藥物的情況下），並且症狀有所改善。如果症狀惡化或呼吸困難，請致電 911。症狀改善或消失後，您無需重複測試，因為在過了您仍然具有傳染性的時間點之後，測試可能會呈陽性。

如果您家中的任何人與您直接接觸過，他們應該監測自己的體溫並在 14 天內關注發燒、咳嗽或咽喉痛等症狀。他們應避免公共場所和運輸，並且請勿與年老、患有慢性疾病或免疫力低下的人接觸。

如果我的檢測結果陰性，我該怎麼做？

如果您沒有任何症狀，則無需進行家庭隔離。繼續實施常規的預防措施，例如經常洗手和在戶外時戴上面罩。

如果您有症狀，即使測試結果為陰性，您也應該至少在家裡呆七天，最後三天不發燒（在不服用對乙醯氨基酚或布洛芬等退燒藥物的情況下），並且症狀有所改善。如果症狀惡化或呼吸困難，請致電 911。如果您家中的任何人與您直接接觸過，他們應該監測自己的體溫並在 14 天內關注發燒、咳嗽或咽喉痛等症狀。他們應避免公共場所和運輸，並且請勿與年老、患有慢性疾病或免疫力低下的人接觸。

如果您還有其他問題，請聯絡您的私人醫生。如果您沒有私人醫生，您可以致電 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) 聯絡 NYC Health + Hospitals 聯絡中心。

保持健康。保持安全。

NYC Health + Hospitals 門診護理中心