

التطعيمات للجميع

+ حقن الإنفلونزا

+ لقاحات Moderna لعلاج فيروس
كورونا (COVID-19)

- الجرعات الأولى والثانية
- جرعات السلسلة الأولية الإضافية لأولئك الذين يعانون من نقص المناعة
- الجرعات المعززة

متاحة هنا لجميع الأشخاص المؤهلين

نظرًا لقدوم موسم الإنفلونزا وفيروس كورونا (COVID-19) معًا، أصبح الآن مهمًا أكثر من أي وقت مضى أن تحمي نفسك وأحبائك من الإصابة بالمرض.

تعد لقاحات الإنفلونزا وفيروس كورونا (COVID-19) آمنة وعالية الفعالية في تقليل خطر التعرض للمرض ودخول المستشفى لتلقي العلاج وحتى الوفاة.

يمكنك الحصول على لقاح فيروس كورونا (COVID-19) وحقنة الإنفلونزا في نفس الوقت دون دفع أي تكلفة من جيبك.

تعرفّ على المزيد حول اللقاح المناسب لك.
امسح رمز QR ضوئيًا أو اتصل على الرقم
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).



تعرفّ على المزيد حول
لقاح الإنفلونزا



تعرفّ على المزيد حول
لقاحات فيروس كورونا
(COVID-19)



من الذي يجب أن يحصل على اللقاح لمكافحة الإنفلونزا وفيروس كورونا (COVID-19)؟

لقاح الإنفلونزا

ينبغي على كل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر وما فوق الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي كل سنة، وبصفة خاصة:

- + الأطفال أقل من عامين
- + الأشخاص الأكبر من 65 عامًا
- + الحوامل أو النساء اللواتي أنجن حديثًا
- + الأشخاص المصابون بحالات طبية مثل السكري أو الربو أو مرض القلب أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)
- + العاملون الأساسيون، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية ومقدمو الرعاية للأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بالمرض. يجب على أولئك الذين يعتنون بالأطفال، وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، الحصول على لقاح الإنفلونزا.

لقاح فيروس كورونا (COVID-19)

معظم الأفراد مؤهلون الآن للحصول على لقاح فيروس كورونا (COVID-19):

- + يمكن للأشخاص في سن 5 إلى 11 سنة الحصول على اثنتين من جرعات الأطفال (ثلاث القوة) لـ Pfizer-BioNTech
- + يمكن للأشخاص في سن 12 عامًا وأكبر الحصول على جرعتين من Pfizer-BioNTech
- + يمكن للأشخاص في سن 18 عامًا وأكبر الحصول على جرعتين من لقاح Moderna أو جرعة واحدة من Johnson & Johnson/Janssen

جرعات السلسلة الأولية الإضافية من لقاح Moderna أو Pfizer لعلاج فيروس كورونا (COVID-19)

جرعات السلسلة الأولية الإضافية متاحة للأشخاص الذين حصلوا على جرعتهم الثانية من لقاح فيروس كورونا (COVID-19) منذ 28 يومًا على الأقل، ولديهم جهاز مناعي ضعيف بسبب حالة أو علاج، وقد يشمل ذلك على:

- + العلاج النشط للسرطان
 - + زراعة الأعضاء والدواء المستخدم لتقليل قوة الجهاز المناعي
 - + زراعة الخلايا الجذعية خلال آخر عامين
 - + نقص المناعة الأولي المتوسط أو الشديد
 - + فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) غير مُعالج أو متقدم
 - + العلاج النشط بجرعة عالية من الكورتيكوستيرويدات أو الأدوية الأخرى التي تضعف الجهاز المناعي بشكل معتدل أو شديد
- يتعين أن تبلغ من العمر 5 سنوات أو أكبر للحصول على جرعة سلسلة أولية إضافية من Pfizer و18 عامًا أو أكبر للحصول على جرعة سلسلة أولية إضافية من Moderna. لا يُصح بجرعات السلسلة الأولية الإضافية لمعظم الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو الرئة.

جرعة معززة لعلاج فيروس كورونا (COVID-19) - متلقو لقاح Moderna و Pfizer

يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر على جرعة معززة بعد 5 أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية من سلسلة التطعيم الأولية من Moderna أو Pfizer لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).

يجب على الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح Moderna أو Pfizer محاولة الحصول على نفس اللقاح باعتباره جرعتهم المعززة، ولكن لديهم خيار التبديل إلى أي من أنواع اللقاحات الثلاثة المصرح بها في الولايات المتحدة.

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عامًا ممن حصلوا سابقًا على سلسلة Pfizer الابتدائية منذ أكثر من خمسة أشهر مؤهلون للحصول على جرعة Pfizer المعززة فقط. قد يكون بعض الأطفال من منقوصي المناعة الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا مؤهلين للحصول على جرعة إضافية من لقاح Pfizer بعد 28 يومًا من جرعتهم الثانية.

جرعة معززة لعلاج فيروس كورونا (COVID-19) - متلقو لقاح Johnson & Johnson

يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر على جرعة معززة بعد شهرين على الأقل من تلقي جرعة اللقاح الأولية من فيروس كورونا (COVID-19). تعد جرعات Moderna أو Pfizer (لقاحات mRNA COVID-19) مفضلة في معظم المواقع.

توفر المستشفيات الموجودة في نظام NYC Health + Hospitals لقاحات Pfizer وJ&J. توفر مواقع NYC Health + Hospitals/Gotham Health لقاح Moderna. للحصول على قائمة كاملة بالمواقع، تفضل بزيارة موقعنا على الويب: nychealthandhospitals.com.