

모두를 위한 백신접종

임산부, 임신 초기의 여성, 수유 중인 여성 또는 임신을 계획하는 여성을 위한 COVID-19 백신 자주 묻는 질문

여성과 아기의 건강과 안전은 무엇보다 중요합니다. 임산부 또는 임신 초기의 여성은 COVID-19로 인한 중증의 위험이 높습니다.

중증을 예방하고 본인과 아기, 가족을 COVID-19로부터 보호하려면 백신 접종이 가장 좋은 방법입니다.

왜 COVID-19 백신을 접종해야 하나요?

임산부 또는 수유 중인 여성은 COVID-19로 인한 중증이 발생할 확률이 더 높습니다. 호흡 곤란이나 흉통이 발생하여 병원 치료나 집중 치료를 받아야할 수 있습니다. 35세 이상이거나 과체중이며 고혈압이나 당뇨병이 있는 여성은 임신 기간이나 출산 직후에 중증이 발생할 위험이 높습니다. 백신 접종을 하면 면역체계가 산모, 아기, 가족의 건강을 보호해줍니다.

COVID-19 백신은 안전한가요?

그렇습니다. 연구 결과에 따르면 COVID-19 백신은 임신 기간에도 안전하며 임산부와 태아에게 해롭지 않다고 합니다. 사실 Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 및 독감 백신과 같이 임산부가 접종할 수 있는 백신이 있습니다. 이러한 백신은 안전하고 질병 예방에 효과적입니다.

백신은 가족들에게도 안전한가요?

그렇습니다. 아기 주변의 모든 사람들이 백신 접종을 완료하는 것이 중요합니다. 아기는 새로운 면역체계를 가지고 있으며 COVID-19에 취약합니다. 가족들이 백신 접종을 하면 아기의 건강을 보호하는 데 도움이 되고, 감염 확률을 줄일 수 있습니다.

COVID-19 백신을 접종한 후에 모유 수유를 해도 안전할까요?

그렇습니다. 모유 수유를 하는 백신 접종 산모는 COVID-19로부터 보호하는 항체를 만들어 냅니다.

백신 접종 후에는 모유에 항체가 포함되어 있습니다. 모유를 먹는 아기도 항체를 가지게 되며 COVID-19로부터 보호를 받을 수 있습니다.

COVID-19 백신을 접종하고 나면 어떤가요?

메스꺼움, 고열, 피로감, 근육통 등과 같은 부작용이 있을 수 있습니다. 이러한 부작용은 정상적인 현상이며 며칠이면 사라집니다. 일부 부작용은 약을 복용하면 도움이 될 수 있습니다. 의료 제공자에게 가장 적합한 약에 대해 문의해 보십시오. 과거에 백신에 대한 알레르기 반응이 있었다면 COVID-19 백신을 접종하기 전에 의사와 상담하십시오.

부작용은 나와 아기의 건강에 해로울까요?

아닙니다. 백신 접종 후에 부작용이 있다면 우리 몸에서 COVID-19와 싸우는 힘을 기르는 것입니다. 백신 부작용은 흔하게 발생하며 일반적으로 증상이 경미하고 아기에게 해롭지 않습니다.

COVID-19 백신 때문에 유산할 수 있나요?

아닙니다. 연구 결과에 따르면 COVID-19 백신은 임신 기간에도 안전하게 맞을 수 있습니다. 백신을 접종한 사람이 그렇지 않은 사람보다 유산의 위험이 높은 것은 아닙니다.

COVID-19 백신은 선천성 결손증을 유발할 수 있나요?

아닙니다. COVID-19 백신은 아기의 DNA를 바꾸지 않습니다. 임신 전이나 임신 중에 COVID-19 백신 접종을 한 수천 명의 여성들 중에서 선천성 결손증을 경험했다는 보고는 없습니다.

COVID-19 백신은 생식 능력에 영향을 줄까요?

아닙니다. COVID-19 백신이 생식 능력에 영향을 주거나 남녀에게 임신 관련 문제를 유발한다는 증거는 없습니다.

COVID-19 백신 접종 후에 만들어진 항체는 우리 가족에게 영향을 주나요?

아닙니다. 항체는 COVID-19를 유발하는 바이러스를 퇴치합니다. 항체는 생식기 기능이나 생식 능력에 영향을 주지 않습니다.

백신 접종을 하지 않았는데 임신 중이나 출산할 때 COVID-19에 걸린다면 어떻게 되나요?

COVID-19 백신을 접종하지 않은 임신부는 유산, 미숙아 출산, 자간전증, 사산 등이 발생할 위험이 더 높습니다. 또한 병원의 집중 치료실에서 치료를 받거나 호흡을 도와줄 산소 호흡기에 대한 필요성과 중증으로 인한 사망의 위험도 더 높습니다.